


Est-ce définitif?

NON,

En ce qui concerne les bridges et les couronnes en tout cas : durée de vie, environ 10 à 15 ans.

Les implants sont quant à eux plus définitifs semble-t-il à la vue des garanties fabricants. Pas la couronne qui les surmonte.

Quelques exemples de facettes :



- Lavez-vous les dents au moins 2 fois par jour avec une brosse adaptée.
- Faites des contrôles réguliers.
- Consultez si vous avez des taches ou des lésions qui ne disparaissent pas en quelques jours.
- Posez-lui des questions : votre dentiste sera toujours à votre disposition.
- Evitez de fumer que ce soit tabac ou drogue, ce sont des produits toxiques

Créé en 2016 par CDD129.
degieter.ml@cdd129.com



3 Les prothèses fixes.

Dans ce petit folder, vous trouverez des informations concernant les prothèses fixes :

Couronnes, bridges, facettes, onlays, implants, ...

Il est indispensable de toujours remplacer les dents absentes pour des raisons d'équilibre. Imaginez-vous, marchant avec une seule chaussure, vous allez boiter, et à la longue abîmer vos articulations c'est la même chose en bouche, mais trop souvent on l'ignore !



Si rien n'est fait :



La couronne ... et les bridges



La couronne est la plus connue des prothèses fixes, elle enveloppe toute la surface de la dent et nécessite que la dent soit taillée (+/- 1.2mm). **La couronne renforce et protège la dent.** Elle a une durée de vie (comme la plupart des prothèses fixes) d'environ 10 à 15 ans. La couronne était jadis fabriquée en or, aujourd'hui l'esthétique étant aussi importante que la fonction, les couronnes sont en porcelaine cuite sur du métal ou même entièrement en porcelaine (noyau alumine ou zircone). Lorsqu'une dent manque il est possible de la remplacer par un bridge : 2 couronnes aux extrémités et un élément pontique entre les 2.



Remarque : Les couronnes doivent être brossées comme les dents si de la plaque dentaire s'accumule au niveau de la gencive, cela pourrait provoquer de la gingivite, une rétraction de la gencive et des effets inesthétiques indésirables.




Les facettes et les inlays (onlay)

Les facettes sont actuellement le plus souvent en porcelaine, mais certaines sont en résine (moins bonne stabilité de teinte mais plus « élastique »).

Les facettes sont utilisées pour remplacer des zones usées ou absentes au niveau des dents antérieures et les prémolaires on pourrait les appeler inlays (même principe). Elles nécessitent une taille minimum de 0.8mm.


Les Onlays

Ils sont l'intermédiaire entre l'obturation et la couronne. Plus solides que les « plombages », et plus économes en tissu dentaire, ils sont une excellente alternative à la couronne.



Les implants

Ils existent depuis bientôt 40 ans découvert par le professeur Brainmarck, qui, lors d'expériences sur la cicatrisation osseuse, a constaté que l'os se fixait au titane. Les implants sont une sorte de cheville en titane dans laquelle s'adapte une vis intérieure permettant de fixer différents éléments de prothèses : des couronnes vissées, des faux moignons des bridges des attachements. Les implants de la marque Nobel sont actuellement garantis à vie.



L'implant est une solution idéale pour remplacer une ou plusieurs dents surtout chez le patient jeune dont les dents voisines de la dent absente n'ont pas encore été soignées. Fonctionnellement il supporte la charge d'une dent.

