

Est-ce définitif?

NON, **d'abord** lors du placement la prothèse, il faut retoucher l'appareil (c'est un peu comme un sabot, il faut l'adapter à la bouche, et ce n'est pas la bouche qui doit s'y adapter.... Bien que psychologiquement il y ait une adaptation à prévoir.

Ensuite, il faut vérifier régulièrement la stabilité de la prothèse une prothèse qui bouge sans cesse peut provoquer des lésions importantes par le frottement qu'elle provoque. Cette mobilité peut aussi provoquer des hypertrophies gingivales.

Ici sous une prothèse supérieure



Dans ce cas une chirurgie est nécessaire pour rétablir et assainir la situation.

Il faut enfin vérifier l'usure des dents de la prothèse et en cas d'usure trop importante, refaire un nouvel appareil (prévu tous les 7 ans par l'INAMI).

Remarque :

D'une manière générale, si vous ne portez pas votre prothèse laissez-les au sec et mouillez-les avant de les mettre en bouche.

Les bactéries vont mourir au sec alors que si vous les laissez tremper, vous aurez un bouillon de culture en bouche !



Brossez vos prothèses, mais aussi vos gencives afin d'éliminer la plaque qui les recouvre.

- Lavez-vous les dents au moins 2 fois par jour avec une brosse adaptée.
- Faites des contrôles réguliers.
- Consultez-le si vous avez des taches ou des lésions qui ne disparaissent pas en quelques jours.
- Posez-lui des questions, il (elle) sera toujours à votre disposition.
- Evitez de fumer que ce soit tabac ou drogue, ce sont des produits toxiques

Créé en 2016 par CDD129.
degieter.ml@cdd129.com



2. Les prothèses amovibles

Dans ce petit folder, vous trouverez des informations concernant les prothèses dentaires amovibles. C'est-à-dire les prothèses qu'il faut enlever lors du brossage, ou qui remplacent la totalité des dents.

Il est indispensable de toujours remplacer les dents absentes pour des raisons d'équilibre. Imaginez-vous, marchant avec une seule chaussure, vous allez boiter, et à la longue abîmer vos articulations c'est la même



Prothèses acryliques ou avec armature métallique




La prothèse acrylique

Elle est utilisée depuis de nombreuses années afin de remplacer les dents manquantes. Quand il n'y a plus de dents, On parle de prothèse complète.

Ces prothèses ne sont pas fixées, elles tiennent en bouche à la manière de 2 plaques de verre entre lesquelles on a mis de l'eau. La salive joue donc un rôle non seulement pour le maintien de la prothèse, mais diminue aussi les frottements sur les joues qui pourraient la déstabiliser.

Lors d'une édentation précoce, les os de la mâchoire peuvent « fondre » comme le montre le schéma ci-dessous.



Quand il reste encore assez d'os, mais que les prothèses manquent de stabilité on peut placer des implants et des attachements qui vont fixer la prothèse comme le ferait une pression.



Rem : à partir de 70 ans, ces implants sont pris en charge par la mutuelle.

Partiel provisoire ou définitif...

Généralement, on réalise des prothèses partielles acryliques pour des travaux provisoires (en attendant de placer des bridges ou des implants). Mais dans certains cas, c'est un choix financier. Ces prothèses sont esthétiques mais moins chères que les prothèses squelettiques.


Les partiels avec armature métallique ou squelettique :

Ces prothèses sont plus fines plus résistantes et mieux adaptées qu'elles soient avec crochets ou attachements.

Prothèse partielle métallique



Les prothèses squelettiques avec attachements sont ce qu'on fait de mieux en prothèse amovible. Elles sont discrètes (pas de crochet visible) et tiennent bien en bouche (friction des attachements). L'attachement est coulé dans une couronne et dans l'appareil se trouve la partie femelle ?



L'entretien des prothèses.

Les prothèses doivent être brossées en douceur avec soit des savons spécifiques pour prothèses soit avec du Dreft® et rincées abondamment.



Ce type de brosse permet de nettoyer l'extérieur, mais aussi et surtout l'intérieur de la prothèse.

Les comprimés

Si du tartre se dépose sur l'appareil, laissez-le tremper pendant 15 min dans du vinaigre (froid) brossez (refaites cette opération si tout n'est pas parti) rincer. JAMAIS D'EAU DE JAVEL !

Lorsque vous portez un appareil partiel n'oubliez pas de retirer votre appareil pour vous brosser les dents (les vôtres). Brossez aussi à l'aide d'une brosse « chirurgicale » vos gencives là où pose l'appareil.